



بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی (ره)
مدیریت خدمات پرستاری - آموزش به بیمار



جراحی بای پس معده



تهیه کننده:
واحد آموزش به بیمار و ارتقای سلامت همگانی

www.golpaygani-h.ir

۰۲۵ ۳۱۶ ۱۱۱۱

فعالیت و مراقبت بعد از عمل جراحی:

- پیاده روی روزانه، ضروری بوده و از لخته شدن خون در ورید های عمقی ساق پا پیشگیری و خطر آمبولی ریه را به حداقل می رساند.
- جوراب واریس حداقل تا زیر زانو و به مدت ۱۰ روز پس از عمل جراحی پوشیده شود.
- بیمار دو روز پس از عمل جراحی به استحمام می باشد.
- هنگام مصرف مایعات از تماشای تلویزیون خودداری شود.
- از نوشیدن مایعات با استفاده از نی خودداری شود و رژیم غذایی طبق نظر پزشک استفاده شود.

علائم و شرایط نیازمند مراجعه به پزشک

- پس از ترخیص طبق نظر پزشک به مطب پزشک مراجعه شود.
- تب بالای ۳۷/۸ درجه سانتی گراد
- عدم دفع مدفوع و گاز
- کاهش حجم ادرار
- تهوع و استفراغ بیش از حد

منابع:


کتاب داخلی و جراحی برونز و سوداژت
better health

مصرف دارو:

- شاممکن است از قبل جراحی به علت بیماری های زمینه ای نظیر دیابت و فشارخون داروهایی را مصرف نمائید که در بسیاری از موارد نیاز به داروها کمتر میشود یا ممکن است نیاز به مصرف دارو از بین برود.
- مصرف روزانه یک عدد کپسول مولتی مینرال برای رفع نیازهای شما از یک هفته بعد از عمل ضروری می باشد.
- مسکن ها برای کاهش درد تجویز می شود.



مراحل بای پس معده



جدا نمیشود و قسمت بزرگتر معده کماکان به ترشح آنزیم های معمول میپردازد ولی غذا وارد این قسمت نمیشود. سپس یک قسمت از روده را به معده ی کوچکتر متصل می کنند.

لذا فرد سریع تر از قبل احساس پر شدن معده و سیری خواهدداشت و در ضمن مواد غذایی کمتری نیز جذب میشود.

عوارض جراحی بای پس معده:

- یکی از عوارض این عمل سوء جذب بعضی ویتامین ها می باشد که با تجویز مکمل های ویتامینی رفع خواهد شد.

- خون ریزی و عفونت زخم از عوارض احتمالی این جراحی می باشد.

- استفراغ مکرر ، که معمولا به دلیل خوب نجویدن غذا اتفاق می افتد و در صورت ادامه استفراغ مراجعه به پزشک ضروریست.

- مشکلات تنفسی و ریه مانند تنگی نفس تپش قلب، درد قفسه سینه از عوارض احتمالی و مهم این جراحی می باشد.

جراحی بای پس معده

شرح بیماری: عمل بای پس معده نوعی عمل جراحی به روش لاپاراسکوپی (روش دوربین پزشکی) است، این عمل به منظور لاغری و کاهش وزن موثر در افرادی که چاقی مرضی دارند انجام میشود که معمولا افرادی هستند که شاخص بدنی BMI آنها ۴۰ و بالاتر از ۴۰ باشد.

چاقی بسیار شدید فرد را مستعد انواع بیماری ها مانند بیماری های عروق، کرونر، فشارخون، دیابت نوع بالغین، آرتروز در مفاصل، تنگی نفس بیماریهای کیسه صفرا، انواع سرطان، بالارفتن فشارمغز، میگرن و همچنین فوت ناگهانی میکند .

کاهش وزن پس از انجام عمل بای پس، از روش های دیگر سریع تر است و در افرادی که رژیم غذایی محدودکننده در آنها کاربرد ندارد بهترین روش درمانی جایگزین است.

هدف از انجام عمل جراحی بای پس:

در این روش درمانی دو هدف دنبال میشود که هدف اول اینکه فرد غذای کمتری میل کند و هدف دوم اینکه مواد غذایی کمتر جذب شود.

ابتدا معده را با دوختن به دو ناحیه تقسیم کرده و در این روش هیچ قسمتی از معده